

1)PREPARAZIONE CON PLENVU PER PAZIENTI NON FABICI:

(1 litro preparazione + 1 litro di liquidi chiari)

Colonscopia programmata dalle ore 8,30 alle 10: il giorno prima dell'esame ore 19,30 –20.30 bere la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Fare pausa di un'ora e bere la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). La mattina è permesso bere acqua fino a due ore prima dell'inizio dell'esame.

Colonscopia programmata dopo le ore 10: il giorno prima dell'esame ore 20.00 –20.30 bere la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Il giorno stesso dell'esame: 4 ore prima dell'inizio dell'esame bere la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Due ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

Colonscopia programmata dopo le ore 14: il giorno stesso dell'esame non è permessa la colazione. Ore 07:00, bere la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Fare pausa di un'ora e bere la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti. In seguito bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla). Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete. 2 ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

Dose 1



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Dose 2



Dopo aver assunto la dose di PLENVU, bere **ALMENO** un altro ½ litro di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

NOTA BENE: NON INVERTIRE la sequenza delle dosi

NON DIMENTICARE:

Per entrambi i preparati sopraindicati è opportuno attenersi rigorosamente alle regole al fine di garantire una corretta pulizia intestinale che eviti così di dover ripetere successivamente l'esame. L'eventuale comparsa di nausea o pesantezza all'assunzione dei prodotti è normale e non deve preoccupare. Per diminuire questi effetti si consiglia di assumere il prodotto più lentamente.

Impegnativa mutualistica con pagamento del ticket. (i pazienti con età maggiore di 45 anni hanno diritto ad una colonscopia ogni 5 anni con esenzione per screening: nell'impegnativa deve essere indicato il Codice Esenzione D04).

Documentazione medica (radiografie, esami di laboratorio, foglio di dimissione).

È consigliabile farsi accompagnare per l'uso di sedativi in corso d'esame.

Evitare l'assunzione di prodotti oleosi(es. olio di vasellina) o preparati a base di ferro.

Eventuali urgenze endoscopiche durante la mattinata possono creare ritardi, anche importanti, rispetto all'orario di prenotazione.